

Avertissements agricoles

AVERTISSEMENT GRANDES CULTURES
destiné aux agriculteurs du Lauragais, de la Piège et du Razès
en rédigé en collaboration avec la ferme de Loudes et la Chambre d'Agriculture

N° 1 C DU 23/02/95

GRANDES CULTURES N° 1

COLZA = Charançons C. Napi - Mèligèthes

BLE = Rouille brune - Oïdium - Pucerons

COLZA

RAVAGEURS : C.Napi ou Charançons de la tige.

Les pièges du S.P.V. indiquent une activité moyenne de ce ravageur depuis une semaine, ces pièges sont installés à : FANJEAUX, MOLANDIER, CASTELNAUDARY, REVEL.

Les Colzas sont au stade sensible : Tige inférieure dans la plupart des situations à 20 cm.

On peut observer les premières Mèligèthes, nuisibles tant que les premières fleurs ne sont pas épanouies.

Enfin les premières colonies de pucerons cendrés commencent à s'installer plus particulièrement sur les bordures et il convient de les éliminer autant que possible.

Nous vous proposons une des solutions suivantes : (à appliquer dès réception)

- | | | | |
|-------------|---|------|--------|
| - KARATE | à | 0,15 | L / Ha |
| - DECIS CE | à | 0,2 | L / Ha |
| - BAYTHROID | à | 0,3 | L / Ha |

4050 51 598

1995 = N° 1-7

mq5



DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
2400 ALCOB P. 3056
34034 MONTPELLIER CEDEX 01
Tél. 67 10 19 60 Fax 67 03 10 21

PUBLICATION PÉRIODIQUE
IMPRIMERIE DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON
LE DIRECTEUR M. FREYDIER - N° D'inscription 531 AD
ABONNEMENT ANNUEL - RÉGISTREUR DE RECETTES DE LA D.R.A.F.
C.C.P. MONTPELLIER 5238-12 G

BLE

- Les parcelles ne sont pas toutes au même stade.
- Les variétés ne sont pas toutes concernées de la même façon, par exemple Brindur - Oïdium + RB Primadur RB essentiellement - Acalou est presque aussi sensible que Brindur, il faut surveiller cette variété.

On peut observer :

1*) de la Rouille Brune : le niveau d'attaque est important compte tenu de l'époque, mais cette attaque était prévisible.

2*) de l'Oïdium : le stade de grande sensibilité "tallage" est dépassé, et nous n'avons pas observé de niveau d'infestation très élevé, sauf quelques parcelles bien précises.

3*) des Pucerons : Sitobium Avenae et Rhopalosiphum Padi, il convient de les éliminer (risque de vection de viroses).

Avant toute décision de traitement, observez vos cultures, les plus avancées sont au stade 6 "1 noeud", si vous devez intervenir maintenant, ce sont des cultures qui recevront au moins 3 traitements.

1) Stade avancé - Culture précoce : la Rouille Brune est dominante, appliquez :

ou	- PAINDOR	à	0,33	L/Ha
	- OPUS	à	1	L/Ha
	+			
	un des insecticides suivants destinés à éliminer les pucerons			
	- DECIS	à	0,3	L/Ha
	- KARATE	à	0,15	L/Ha
	- BAYTHROID	à	0,3	L/Ha
	- TALSTAR	à	0,075	L/Ha

2) Stade avancé - Cultures précoces : Rouille Brune et Oïdium

- CORBEL	à	1	L/Ha
+			
un des insecticides ci-dessus cités			

3) Cultures moins précoces : peu de R.B., peu d'Oïdium. Attendre un nouvel avis, mais couverture insecticide si présence de Pucerons.

RECOMMANDATIONS

Concernant l'utilisation des spécialités agropharmaceutiques.

Nous ne pouvons cautionner l'utilisation de fongicides à dose réduite ou en mélange avec des solutions qualifiées d'Adjuvants, qui ne sont le plus souvent que des produits destinés au rinçage des pulvérisateurs. Ces pratiques sont dangereuses, elles peuvent provoquer ou accélérer le processus d'apparition de souches résistantes, elles sont souvent inefficaces et peuvent être phytotoxiques, le gain apparent de quelques dizaines de francs peut conduire à de grands déboires. Nous ne saurions donc trop vous mettre en garde contre ces pratiques.

Nous restons à votre disposition pour vous fournir de plus amples renseignements si vous le souhaitez.